

nome e cognome:

matricola

GALENO ○

IPPOCRATE ○

VECCHI ORDINAMENTI ○

Scrivere le risposte di ciascun quesito negli apposti spazi.

Esercizio 1. (Punti 7) In tabella sono riportati i dati, relativi al tempo di vita X in *mesi* di una popolazione di animali, misurati su un campione di 100 animali.

X_i (mesi)	15	17	20
f_i (frequenza assoluta)	20	50	30

- Calcolare la media e la varianza.

media: $\bar{X} = 17.5$ mesi

varianza: $s^2 = 3.25$ mesi²

- Come cambiano media e varianza misurando i tempi in *giorni*?

media: $\bar{X} = 30 \cdot 17.5 = 525$ giorni

varianza: $s^2 = 30^2 \cdot 3.25 = 2925$ giorni²


Svolgere i calcoli e scrivere il risultato finale con almeno due cifre decimali.

Esercizio 2. (Punti 7) Si consideri la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{per } -1 \leq x < 0, \\ |x - 1| & \text{per } 0 \leq x \leq 3, \\ -2x + 8 & \text{per } 3 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

- Disegnare il grafico di f .

grafico:



- Nell'intervallo $[0, 3]$ la funzione è convessa?

risposta: sì

- Determinare ascissa e ordinata dei punti di massimo e minimo relativi e assoluti di f in $[-1, 4]$.

punti di massimo assoluto: $(3, 2)$

punti di minimo assoluto: $(-1, 0)$, $(1, 0)$ e $(4, 0)$

punti di massimo relativo: $(0, 1)$ e $(3, 2)$

punti di minimo relativo: $(-1, 0)$, $(1, 0)$ e $(4, 0)$

Esercizio 3. (Punti 6) Si dispone di una soluzione S_1 concentrata al 15% e di una soluzione S_2 (dello stesso soluto nello stesso solvente) concentrata al 30%. Trovare la concentrazione di una soluzione S_3 composta dal 20% di S_1 e dall'80% di S_2 . Determinare il peso iniziale di S_1 in grammi sapendo che, se aggiungo 25 g di soluto, la concentrazione diventa del 40%.

concentrazione di S_3 : 27%

peso di S_1 : 60 g

Esercizio 4. (Punti 4) Si vuole stimare il valore medio μ del carattere di una popolazione. Su un campione di $n = 4900$ individui risulta una media $\bar{x} = 50$ e una deviazione standard campionaria $s = 105$. Trovare gli intervalli di confidenza al 95% e all'89% per la media μ , usando la tabella allegata (svolgere i calcoli e scrivere il risultato finale arrotondato alla seconda cifra decimale).

intervallo di confidenza al 95%: [47, 53]

intervallo di confidenza all'89%: [47.6, 52.4]

Esercizio 5. (Punti 4) È data la funzione $f(x) = \sqrt{3-x}$.

- Determinare il campo di esistenza della funzione.

campo di esistenza: $(-\infty, 3]$

- Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione nel punto di ascissa $x = 2$.

equazione della retta: $y = -\frac{1}{2}x + 2$

- Trovare l'espressione della funzione composta $g(x) = f((x-1)^2)$.

funzione composta: $g(x) = f((x-1)^2) = \sqrt{-x^2 + 2x + 2}$

- Calcolare la derivata di g .

derivata di g : $g'(x) = \frac{-x+1}{\sqrt{-x^2+2x+2}}$

Area sotto la curva normale standardizzata

valori di u	Nell'intervallo $[\mu - u\sigma, \mu + u\sigma]$	Fuori dell'intervallo $[\mu - u\sigma, \mu + u\sigma]$	Nell'intervallo $[\mu + u\sigma, +\infty)$
0	0	1	0,5
0,2	0,1586	0,8414	0,4207
0,4	0,3108	0,6892	0,3446
0,6	0,4514	0,5486	0,2743
0,8	0,5762	0,4238	0,2119
1	0,6826	0,3174	0,1587
1,2	0,7698	0,2302	0,1151
1,4	0,8384	0,1616	0,0808
1,6	0,8904	0,1096	0,0548
1,8	0,9282	0,0718	0,0359
2	0,9544	0,0456	0,0228
2,2	0,9722	0,0278	0,0139
2,4	0,9836	0,0164	0,0082
2,6	0,9906	0,0094	0,0047
2,8	0,9950	0,0050	0,0025
3	0,9974	0,0026	0,0013
3,2	0,9986	0,0014	0,0007
